Canaux atrioventriculaires

Fanny BAJOLLE

CMR M3C

Necker Enfants Malades

Généralités

- 4% des cardiopathies soit 250 nouveaux cas par an en France
- Trisomie 21 associée +++
- Si T21 + cardiopathie : environ 50% de CAV
- Orientation diagnostique à l'ECG : axe au plafond (AVR)
- Importance de l'échocoeur : un seul anneau!!!
- Evaluation du retentissement du shunt G-D
- Chirurgie avant 6 mois, à partir de 5 kg idéalement

Physiopathologie des CIV

Les shunts à l'étage ventriculaire regardent les résistances pulmonaires et systémiques en systole

Le sens du shunt est fonction des résistances vasculaires pulmonaires

Les shunts ventriculaires dilatent les cavités gauches

Physiopathologie des CIA

Les shunts à l'étage auriculaire regardent les compliances des ventricules en diastole

Le sens du shunt est fonction des compliances ventriculaires

Les shunts auriculaires dilatent les cavités
droites

CAV

© Mayo Foundation for Medical Education and Research. All rights reserved.

Les CAV dilatent les
cavités gauches et droites

- $$\frac{Q_p}{Q_s} = \frac{\text{sat Ao} - \text{sat VC}}{\text{sat VP} - \text{sat AP}}$$

- $\Delta P = Q \times R$

- $$\frac{RV_p}{RV_s} = \frac{\Delta P_p \times Q_s}{\Delta P_s \times Q_p} = \frac{\Delta P_p}{\Delta P_s} \times \frac{1}{QP/QS}$$

⇒ **Shunt G-D ?**

⇒ Cardiopathie à sang mélangé?

⇒ Shunt D-G

Principe de FICK:
 $Q_p = \frac{PAP}{R_p}$

Principe de FICK:
 $Q_p = \frac{PAP}{R_p}$

Quelle est la valeur du rapport débit pulmonaire/débit systémique (Q_p/Q_s) (considérez que la fonction d'hématose est normale et que le débit systémique est normal)

- CAV complet- SaO₂ pulmonaire 90%
- CAV complet- SaO₂ pulmonaire au KT = 85%
- CAV complet- SaO₂ pulmonaire au KT = 70%

Canal atrioventriculaire : définition

- Anatomique : zone de jonction entre oreillettes et ventricules, composée de :
 - Valves atrioventriculaires
 - Partie basse du septum interauriculaire
 - Partie postéroinférieure du septum interventriculaire :
Septum d'admission
- Pathologique : cardiopathie congénitale
 - Jonction auriculoventriculaire commune (un seul anneau)
 - CIA type ostium primum
 - CIV d'admission
- **Embryologique** : l'ensemble de cette jonction s'organise autour du mésenchyme des bourgeons endocardiques du canal

Le canal atrioventriculaire embryologique

- Early looping stage : Zone reliant l'oreillette commune au ventricule gauche en développement
- Bordée par les bourgeons endocardiques du canal atrioventriculaire

Formation des valves AV : septation du canal atrioventriculaire

- Contemporaine de la septation auriculaire et ventriculaire
- Septation auriculaire : septum primum et épine (crête) vestibulaire
- Valve AV commune (CAV) = déficience de l'épine vestibulaire

CAV : un seul anneau valvulaire

Bourgeons endocardiques: VAV

Bourgeon inférieur

Bourgeon supérieur

Bourgeons du conus

Bourgeons latéraux

Septation auriculaire

Septum primum

VP

Ostium primum

Bourgeons endocardiques

Epine vestibulaire

Muscularisation

Embryologie CAV résumé

- Septation atrioventriculaire = processus particulièrement complexe
- nécessite plusieurs étapes... de la loop au wedging !
 - Établissement de la continuité OD-VD
 - Alignement des septa IA et IV (Convergence)
 - septation atriale et de la partie postérieure du SIV
 - Wedging de la valve aortique entre mitrale et tricuspide
- Très souvent perturbé: le CAV fait partie de nombreux syndromes
 - T21 (Down syndrome)
 - CHARGE
 - Ellis-Van Creveld, etc.....

CAV : formes anatomiques

- CAV complet : un orifice commun (CIV)
- CAV partiel : deux orifices (CIV fermée)
- CAV intermédiaire : CIV restrictive(s)

CAV : un seul anneau valvulaire

1 seul orifice
CAV complet

2 orifices
CAV partiel

CAV complet

1 seul orifice

CAV : un seul anneau valvulaire

CAV : CIA type ostium primum

Oreillette
droite

CIV d'admission

Ventricule gauche normal

CAV : aspect « scooped-out »
du septum interventriculaire

CAV partiel

2 orifices

CAV : un seul anneau valvulaire

CAV : la CIV existe toujours

CAV partiel

Septum
côté VG

Cleft = fente mitrale

CAV partiel

Valve « mitrale » vue du ventricule gauche

CAV intermédiaire

CAV : un seul anneau valvulaire

CIV
restrictive

Aspect
« scooped-out »
du septum IV

Hémivalve
antérosupérieure

Hémivalve
postéroinférieure

Ventricule gauche

Attaches des hémivalves sur la crête septale

CAV : l'aorte est « unwedged »,
au-dessus de la valve commune

- CAV : défaut de formation du septum d'admission
- Voie d'éjection plus longue et plus étroite
- Mais continuité mitro-aortique

Comment analyser un CAV?

- Défaut septal anatomique/shunt ventriculaire
- Analyse du composant gauche
 - orifice (3 composants, répartition droite/gauche)
 - étoffe des feuillets
 - cordages, piliers
 - fuite
 - Attaches mitrales dans la voie sous-aortique.

Le composant gauche

"l'orifice gauche" (coupe petit axe)

- Taille du VG...
- Déséquilibre: (répartition gauche/droite de l'étoffe)
- Alignement orifice -ventricule
- Les trois composants valvulaires
- Appareil sous valvulaire

Le composant gauche l'étoffe (4 cavités et longitudinale)

- Surface de coaptation
 - L'étoffe entre l'anneau et le bord libre
 - Appareil sous valvulaire
 - cordages

Le composant gauche et les lésions associées

- Les doubles orifices

Le composant gauche : la fuite?

- Une valve qui fuit beaucoup est -elle une mauvaise valve?
 - oui chez le tout petit (foetus , nouveau né)
 - pas toujours chez le grand
 - certaines fuites sont évolutives (dilatation du coeur et béance de la fente) sans valeur pronostique
- Une valve étanche est -elle garante d'un bon résultat?
 - non
 - le chirurgien va tout changer

La voie sous aortique en
col de cygne

Normal AV septation

Inlet/Outlet Ratio = 1.0

AV septal defect

Inlet/Outlet Ratio = 0.77

L'étroitesse de la voie sous-aortique des CAV est liée
aux rapports entre l'hémivalve antérieure et le septum

Traitement avant la chirurgie

Enrichissement alimentaire (DM et huile)

NEDC en attente de chirurgie (130% de calories)

Fer très précoce pour limiter anémie à 3 mois

ou Transfusion sanguine pour obtenir 15g si besoin

Lasilix per os ssi POG élevée

Synagis®

Cure complète avant 6 mois pour le CAVc (idéalement 5-6 kg)

Cerclage.... À éviter surtout si la VAV fuit....

Mais bonne alternative en l'absence de fuite

CAV déséquilibré: risque de RVM

... le chirurgien va tout changer

Les patches “raidissent” la cinétique des feuillets...et peuvent empêcher la coaptation des hémivalves, même si elle était parfaite

Traitement chirurgical des CAV

CAV complet

Traitement chirurgical des CAV

CAV partiel

Facteurs prédictifs de mauvais résultats

- Les formes avec coarctation
 - Hypoplasie ou malposition "mitrale"
- Ceux qui doivent être opérés tôt dans la vie... alors qu'ils n'ont pas ou peu de shunt ventriculaire
 - Ils ont probablement une "mauvaise mitrale" (peu d'étoffe)
- Les eusomiques

CAV et échographie

Dépistage : le coeur

Décalage mitro-tricuspidien

Fetus 18 WG

13/04/2007 15:26:09

Ostium secundum

Sinus venosus

CIA basse

1:30

Ostium primum

5:10:25

09/03/2018 15:05:30

Ostium primum petit

30/05/2007 15:19:04

Oreillette unique

28/10/2009 13.03.58

1:119

Oreillette unique

CIV

CIV d'admission

04/08/2009 10:30:11

CAV complet

27.02.2005 04:00:42

CIIV restrictive

06/10/2010 11:40:59

CIIV restrictive

Autres CIVs : trabéculée

18/03/2009 11:49:07

1:361

Les ventricules équilibrés

27/09/2010 10:07:55

Les ventricules

Petit VD

L24025,0110 16/08/2014

Les ventricules

Hypoplasie du ventricule droit

7/02/2009 13:01:09

1:79

Les ventricules

Petit VG

29.08.2009 14:15:58

Les ventricules

Hypoplasie du ventricule gauche

01/10/2010 20:15:55

Les ventricules

Ventricule unique

27/01/2009 13:32:07

1:143

CAV voie d'éjection gauche

La voie d'éjection gauche

09/09/2010 10:54:02

Col de cygne

16:11:46

Col de cygne

16:11:05

1:119

CAV Fallot

2009 13:48:34

CAV Malposition

Valves auriculo-ventriculaires

Valves auriculo-ventriculaires

Valves auriculo-ventriculaires

Dystrophie

Valves auriculo-ventriculaires

Fentes

Valves auriculo-ventriculaires

Fentes

Double orifice

Coeur normal

Valves auriculo-ventriculaires

VAV droite petite

Valves auriculo-ventriculaires

Valve AV droite

CAV

Prise en charge médicale adaptée avant la chirurgie

Chirurgie peut être complexe

Risque de réopération très variable