

Tandplejen

Vedr. COVID-19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i tandplejen

5. maj 2020

Til Tandplejen

Sagsnr. 4-0100-243/
E plan@sst.dk

Hermed tilsendes nye retningslinjer vedr. omstilling og gradvis øget aktivitet i tandplejen.

Vedr. Ordinering af test for SARS-CoV-2

For at forebygge smittespredning fra asymptomatiske patienter eller patienter der pga. kognitiv svækkelse ikke kan give udtryk for egne symptomer på COVID-19, er der i de overordnede retningslinjer for sundhedsvæsenet åbnet op for, at tandlæger og tandplejere kan ordinere en test for SARS-CoV-2 forud for aerosolgenererende procedurer eller andre procedurer, som efter en konkret faglig vurdering vurderes, at udgøre en særlig risiko ved indsatser i tandplejen.

Der er i høringsvar efterlyst en mere konkret beskrivelse af hvornår en test kan være relevant, men det er helt bevidst, at tandlægen eller tandplejeren efter egen konkrete faglige vurdering kan ordinere en test forud for behandling i tandplejen, hvor det vurderes at være særligt risikofyldt i forhold til smittespredning til personalet og andre patienter. Hvis testen er positiv for SARS-CoV-2 forud for planlagt procedure, udskydes proceduren og bidrager således med et ekstra niveau af reduktion af smitterisiko i tandplejen.

Den tandlæge eller tandplejer, der skal udføre proceduren henviser til et testcenter efter lokal aftale. Testsvar sendes til patienten og patientens egen læge, der foretager opfølgning ved positivt testresultat. Patienten formidler selv test svar til tandlæge/tandplejer.

Vedr. kapacitetsudfordringer

Der har været tvivl om betydningen af ordet "kapacitetsudfordringer". Med kapacitetsudfordringer menes i denne sammenhæng, at når tandplejen som følge af smittereducerende tiltag, fx maksimalt fysisk fremmøde af patienter på 'hver anden tid', har et mindre dagligt patient-flow end normalt, må der nødvendigvis prioriteres i forhold til tandplejeindsatsen. Denne prioritering foretages lokalt i den kommunale og regionale tandpleje og i den enkelte praksis.

Vedr. tandrensning med ultralyd

Ud fra et forsigtighedsprincip fastholdes i nærværende retningslinje, at tandrensning fortsat skal foregå uden brug af ultralyd.

I NIR for tandklinikker er det anført, at tandrensning med ultralyd er den af de nævnte aerosolproducerende procedurer, der giver størst koncentrationen af mikroorganismer i luften.

Det er bekræftet over for Sundhedsstyrelsen, at ultralydstandrensning ikke medfører et bedre behandlingsresultat af parodontitis, end hvis der kun anvendes håndinstrumenter til behandlingen. Det er videre oplyst, at der i de seneste år er sket en positiv udvikling inden for håndinstrumenter, og at erfaring peger i retning af håndinstrumenter ved korrekt anvendelse giver en særlig effektiv tandrensning ved behandling af parodontitis.

Tandlægeskolerne og de fagpolitiske selskaber opfordres til, at bidrage til at sikre, at tandlæger og tandplejere kender til korrekt og effektiv brug af håndinstrumenter, og har viden om gode arbejdsstillinger for at undgå belastningsskader.

Sundhedsstyrelsen vil undersøge forhold omkring reduktion af aerosoler ved brug af ultralyd med henblik på, at søge at finde en fremadrettet anbefaling vedr. procedurer med anvendelse af ultralyd.

Med venlig hilsen



Camilla Noelle Rathcke
Centerchef, Planlægning