

# MARQUEURS SERIQUES MATERNELS Au 1<sup>er</sup> ou 2<sup>nd</sup> TRIMESTRE

## ECHOGRAPHISTE / PRESCRIPTEUR

- 1 - Informer la patiente
- 2 - Renseigner vos coordonnées
- 3 - Renseigner les données échographiques et remplir la fiche de renseignements cliniques
- 4 - Choisir la stratégie de dépistage
- 5 - Signer le formulaire au verso
- 6 - Faire signer le consentement par la patiente
- 7 - Conserver une copie du consentement signé par la patiente

## LABORATOIRE D'EXAMENS DE BIOLOGIE MEDICALE

- 1 - Faire prélever 5 ml de sang sur tube sec EXCLUSIVEMENT
- 2 - Centrifuger et décanter rapidement
- 3 - Transmettre le prélèvement et ce document au Laboratoire Cerba
- 4 - S'assurer que la patiente a signé le consentement au verso
- 5 - Conserver congelé à -20 °C si transmission supérieure à 48 heures

## INFORMATION PATIENTE

- 1 - Lire l'information
- 2 - Signer le consentement
- 3 - Faire pratiquer le prélèvement sanguin dans votre laboratoire habituel

**NB** : Après anonymisation, les données recueillies sont transmises à l'Agence de Biomédecine et analysées pour évaluer ces stratégies de dépistage de la trisomie 21 fœtale.

## STRATEGIES DE DEPISTAGE AU 17/01/19

- Dépistage combiné au 1<sup>er</sup> trimestre**  
Prélèvement entre **11,0 et 13,6 S.A.** : **le plus tôt possible après l'échographie**  
- monofoetale UNIQUEMENT ;  
- renseignements échographiques joints.
- Marqueurs sériques maternels au 2<sup>nd</sup> trimestre**  
Prélèvement entre **14,0 et 17,6 S.A.**

**LE CONSENTEMENT DE LA FEMME ENCEINTE A LA REALISATION EN VUE DE DIAGNOSTIC PRENATAL *IN UTERO* DE L'EXAMEN MENTIONNE A L'ARTICLE R.2131-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE COMPLETE ET SIGNE PAR LA PATIENTE AU VERSO DE CE DOCUMENT AVANT LE PRELEVEMENT SANGUIN**



